

# Lo que debe saber sobre el tratamiento con AVEED®: una guía para pacientes

**Pacientes:** Revise esta guía para pacientes con su proveedor de atención médica.

- Haga cualquier pregunta que tenga cada vez que reciba una inyección de AVEED.
- Se le pedirá que espere 30 minutos después de recibir una inyección de AVEED para asegurarse de que no presenta ninguna reacción pulmonar potencial ni reacción alérgica.

## ¿Qué es AVEED?

AVEED es un medicamento con receta que contiene testosterona. AVEED se usa en el tratamiento de hombres adultos con niveles bajos o inexistentes de testosterona debido a ciertas afecciones médicas. No se sabe si AVEED es seguro o eficaz para el tratamiento de hombres con niveles bajos de testosterona debido al envejecimiento. No se sabe si AVEED es seguro o eficaz para su uso en niños menores de 18 años de edad.

AVEED contiene testosterona en aceite de ricino. Su proveedor de atención médica le aplicará la inyección de AVEED en el músculo de las nalgas. AVEED se libera lentamente desde el músculo al organismo. Solo puede recibir la inyección de AVEED en el consultorio, la clínica o el hospital de su proveedor de atención médica debido a los posibles riesgos graves.

## ¿Cuáles son los riesgos más graves del tratamiento con AVEED?

- **Una reacción pulmonar grave.** Las pequeñas gotas de aceite de ricino presentes en AVEED podrían desplazarse desde los músculos hasta los pulmones después de recibir el tratamiento con AVEED, lo que se denomina microembolismo graso pulmonar (POME). El POME no es un coágulo sanguíneo que viaja a los pulmones.
- **Reacción alérgica grave o potencialmente mortal** (anafilaxia).

Estas reacciones pueden ocurrir con cualquier inyección de AVEED durante el tratamiento, incluso si no ha tenido ninguna reacción anteriormente.

**Cada vez que reciba AVEED, permanezca en el consultorio, la clínica o el hospital durante 30 minutos para asegurarse de que no presenta síntomas de una reacción pulmonar grave (POME) o una reacción alérgica grave.**

## ¿Cuáles son los síntomas de una reacción pulmonar grave (POME)?

Los síntomas del POME pueden ocurrir dentro de los 30 minutos posteriores a la inyección, y pueden incluir uno o más de los siguientes:

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| • Dificultad para respirar      | • Dolor en el pecho              |
| • Estrechamiento en la garganta | • Sudoración excesiva            |
| • Tos o el impulso de toser     | • Sensación de mareos o desmayos |

## ¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica?

Los síntomas de una reacción alérgica pueden producirse durante o inmediatamente después de la inyección y pueden incluir lo siguiente:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Picazón                     | • Estrechamiento en la garganta  |
| • Sarpullido                  | • Dificultad para respirar       |
| • Dolor de estómago           | • Sudoración excesiva            |
| • Sensación de enrojecimiento | • Sensación de mareos o desmayos |

Si presenta algún síntoma de una reacción grave, obtenga ayuda médica de inmediato.



Estos **NO** son todos los posibles efectos secundarios de AVEED. Consulte la Guía de medicación de AVEED que se le proporcionó o hable con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre otros efectos secundarios.

## ¿Qué puedo hacer para ayudar a reducir los riesgos de AVEED?

1. Informe a su proveedor de atención médica si alguna vez ha sufrido una reacción alérgica a AVEED o a cualquiera de sus ingredientes. Los ingredientes en AVEED son los siguientes:
  - Testosterona undecaonato
  - Aceite de ricino
  - Benzoato de bencilo
2. Conozca los síntomas de una reacción pulmonar grave (POME) y una reacción alérgica grave.
3. **Cada vez que reciba el tratamiento con AVEED, permanezca en el consultorio médico, la clínica o el hospital durante 30 minutos para asegurarse de que no presenta síntomas de una reacción pulmonar grave (POME) o una reacción alérgica grave.**

## ¿Con qué frecuencia recibiré una inyección de AVEED?

Recibirá lo siguiente:

- 1 inyección al comenzar
- 1 inyección 4 semanas después
- 1 inyección cada 10 semanas a partir de entonces

## ¿Dónde puedo obtener más información sobre AVEED?

- Su proveedor de atención médica le entregará la Guía de medicación de AVEED para que la lea cada vez que reciba una inyección de AVEED.
- También puede buscar información adicional en [www.AveedREMS.com](http://www.AveedREMS.com) o
- Póngase en contacto con el Programa REMS de AVEED al **1-855-755-0494**.

## Registro de observación de las inyecciones

Utilice este registro de seguimiento para saber cuándo han transcurrido 30 minutos desde la inyección de AVEED. Si no presenta síntomas de una reacción pulmonar grave (POME) ni una reacción alérgica grave, consulte con su proveedor de atención médica antes de irse.

Hora en la que me aplicaron la inyección	Cuánto tiempo debo esperar en el consultorio	Hora a la que puedo abandonar el consultorio
_____ : _____	<b>30 minutos</b>	_____ : _____

