PRIMEROS PASOS CON XIAFLEX®

Guía para pacientes con contracturas de Dupuytren o enfermedad de Peyronie

01 | SU PRIMERA CITA | 02 | SEPA QUE ESPERAR | 03 | PAGO DEL TRATAMIENTO | 04 | PROGRAME SUS CITAS | 05 | MANTÉNGASE AL DÍA CON EL TRATAMIENTO | 06 | VUELVA AL RITMO DEL PACIENTE

01 SU PRIMERA CITA

5 PASOS

Estas ayudas pueden comentar durante su cita:

- **Sus preguntas sobre la enfermedad de Peyronie (EP).**
  Si necesita un punto de partida, descargue nuestra Guía de conversación para el médico.

  GUÍA DE CONVERSACIÓN PARA EL MÉDICO

  DESCARGAR >

- **Si es un posible candidato para XIAFLEX,** el único tratamiento no quirúrgico para la EP aprobado por la FDA.
- **Ilangos y beneficios del tratamiento con XIAFLEX.**

Se trata XIAFLEX® de los siguientes casos:

- La placa de Peyronie que se debe tratar afecta al "curvado" por el que se alrededor la erna (curvas).
- El ensayo a la colagenasa de clostridium histolyticum o a cualquier otro tratamiento para la EP no ha logrado un cambio en la placa.

Consulte a todos compañías de los ingredientes de XIAFLEX® en la Guía del medicamento.

02 SEPA QUE ESPERAR

5 PASOS

Si tratamiento continúa con una serie de inyecciones en el consultorio,

XIAFLEX debe ser administrado en la placa por un proveedor de atención médica que esté capacitado y que tenga experiencia en el tratamiento de nódulos o enfermedad de Peyronie.

Mediante del parte en casa:

Su tratamiento no tratamiento cuando sale de la consulta. Su proveedor de atención médica le dará instrucciones para obtener más información sobre el programa de tratamiento y los ejercicios en casa.

PÍDALES PARA EL TRATAMIENTO EN CASA

XIAFLEX puede ocasionar efectos secundarios serios, entre los que se incluyen:

1. **Fractura de pene (ruptura de los cuerpos cavernosos) cuando una lesión sana en el pene.**
2. **Reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia.**
3. **Reacciones de dolor de espalda.**

Son ambiguos, entre otros. Para todos los posibles efectos secundarios de XIAFLEX, consulte la información importante de seguridad del continuación y consulte la página 17 del folleto de información de prescripción más información, y hable con su urólogo.

PÍDALES PARA EL TRATAMIENTO EN CASA

INFORME AL PACIENTE

03 PAGO DEL TRATAMIENTO

5 PASOS

Programa de asistencia para copago de XIAFLEX.

Hr 1 de los pacientes elegibles deben pagar 60 de su bolsillo por el Programa de Asistencia para Copago de XIAFLEX.

Consulte al renlex los requisitos de elegibilidad del programa de XIAFLEX llamando al

1. **1-800-745-2382**

Si es apto, averigüe cómo su médico ordenará el medicamento y cómo debe enviarse su copago.

Completa y devuelve el formulario de inscripción de Endo Advantage que le envíe su médico.

La mayoría de los pacientes elegibles con cliente de seguro comercial deberían pagar $0 de copago por XIAFLEX. Medicinales basados en el análisis histórico recientemente presentados de septiembre de 2022 a agosto de 2023.

04 PROGRAME SUS CITAS

5 PASOS

XIAFLEX puede ser administrado únicamente en todo neonatal (placa de Peyronie) durante 1 a 2 días de tratamiento, con 6 semanas de diferencia entre cada ciclo. Consulte la página 17 de la información de prescripción para saber cómo formular un ciclo adicional.

PÍDALES PARA EL TRATAMIENTO EN CASA

ENVÍO VÍA

Programe todas sus citas antes de comenzar con la fase de tratamiento para asegurarse de que se mantiene al día con el tratamiento.

Cada ciclo de tratamiento puede requerir 3 citas en el consultorio, con 1 a 3 días de diferencia.

UN CICLO DE TRATAMIENTO

- **VISITA 1**
  Inyección 1
  Espere de 1 a 3 días
- **VISITA 2**
  Inyección 2
  Espere de 1 a 3 días
- **VISITA 3**
  El urólogo verifica la enfermedad de la placa.

También se aseguran de que no exista ninguna **reacción adversa** a la inyección de XIAFLEX y que no haya **otras actividades importantes.**

No debe tener relaciones sexuales ni participar en ninguna otra actividad sexual entre la primera y la segunda inyección de un ciclo de tratamiento.

No debe tener relaciones sexuales ni participar en ninguna otra actividad sexual entre la segunda inyección y cualquier día después de la segunda inyección de un ciclo de tratamiento **hasta** después de que haya desaparecido el dolor y la inflamación.

05 MANTÉNGASE AL DÍA CON EL TRATAMIENTO

5 PASOS

Los resultados de cada persona serán diferentes.

Puede recibir hasta cuatro ciclos de tratamiento a menos que su curva se reduzca a menos de 15 grados, o a menos que no haya ninguna ya no es necesario el tratamiento. Consulte la página 17 de la información de prescripción de XIAFLEX para obtener más información sobre algunos grados de curvatura exitosa.

PÍDALES PARA EL TRATAMIENTO EN CASA

GRAFICA DE CURVATURA DE PENE

06 VUELVA AL RITMO DEL PACIENTE

5 PASOS

Escuche a otros hombres con **EP.** Descubra cómo abordaron su tratamiento y aprenda a reducir su curvatura con XIAFLEX.

HISTORIAS DE PACIENTES

¿QUÉ ES XIAFLEX®?

Es un medicamento que se administra mediante una serie de inyecciones en el pene para tratar la enfermedad de Peyronie (EP) en adultos con una placa palpable y una curva de más de 30 grados en el pene al inicio de la terapia.

No se sabe si XIAFLEX es seguro y eficaz en menores de 18 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No hay XIAFLEX® en:

- Niños menores de 18 años
- Personas que no tienen la EP
- Personas con una placa que no es palpable

XIAFLEX puede ocasionar graves efectos secundarios, entre los que se incluyen los siguientes:

1. **Fractura de pene (ruptura de los cuerpos cavernosos) a otra lesión en el pene.** Algunos hombres que han tenido una fractura de pene también tuvieron otras lesiones en los cuerpos cavernosos. Luego del tratamiento con XIAFLEX, uno de estos conductos puede romperse (fractura de pene) cuando se doble su pene (erección) o cuando se mantiene a flácido de pene, y podrían sentir un crujido para repetir el sólo (flácido). El dolor puede no mejorar después de una fractura de pene. Los síntomas incluyen:
   - Luego del tratamiento con XIAFLEX, los vasos sanguíneos del pene pueden romperse (fractura de pene) cuando se doble su pene (erección) o cuando se mantiene a flácido de pene, y podrían sentir un crujido para repetir el sólo (flácido). El dolor puede no mejorar después de una fractura de pene. Los síntomas incluyen:
   - Luego del tratamiento con XIAFLEX, los vasos sanguíneos del pene pueden romperse (fractura de pene) cuando se doble su pene (erección) o cuando se mantiene a flácido de pene, y podrían sentir un crujido para repetir el sólo (flácido). El dolor puede no mejorar después de una fractura de pene. Los síntomas incluyen:
   - un sonido o una sensación de crujido en el pene
   - pérdida repentina de la capacidad de mantener una erección
   - hinchazón en el pene
   - hematomas morados o inflamación en el pene
   - dificultad para orinar y vaciar la vejiga

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los síntomas de rotura de los cuerpos cavernosos o rotura del pene en el pene que se mencionan anteriormente.

Si tiene una fractura de pene, no debe tener relaciones sexuales ni participar en ninguna otra actividad sexual entre la primera y la segunda inyección de un ciclo de tratamiento.

No debe tener relaciones sexuales ni participar en ninguna otra actividad sexual durante el tiempo entre la segunda inyección y cualquier día después de la segunda inyección de un ciclo de tratamiento **hasta** después de que haya desaparecido el dolor y la inflamación.

XIAFLEX puede ocasionar graves efectos secundarios, entre los que se incluyen los siguientes:

- Lesión de tendones o ligamentos
- dificultad para respirar
- dolor en el pecho
- hinchazón del hígado
- hinchazón del pene

2. Reacciones de dolor de espalda. Después de recibir una inyección de XIAFLEX para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie, algunos hombres sintieron dolor de espalda, incluso dolor lumbar (dolor que se extiende por la parte inferior de la espalda). Algunos hombres que tuvieron dolor de espalda también experimentaron dolor de pecho. Estos síntomas suelen desaparecer en 10 minutos o menos, pero pueden durar más tiempo.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor de espalda repentino, dolor en el pecho o dificultad para continuar después de una inyección.

3. Desmayos. Los desmayos (pérdida de la conciencia) o casi desmayos (sensación de mareo o de que se va a desmayar) son efectos que se han tenido lugar después de una inyección.

Si después de recibir XIAFLEX usted tiene mareos o siente que se va a desmayar, siéntese o acuéstese hasta que se sienta mejor.

Antes de recibir XIAFLEX, informe al proveedor de atención médica si:

- tiene problemas de coagulación o toma medicamentos que afectan la coagulación de la sangre, como la warfarina (Coumadin®, Jantoven®), o tiene problemas de hemorragia, o si le ha salido un moretón con facilidad, o si tiene cualquier otra afección médica, informe a su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica puede decidir si es seguro para usted recibir XIAFLEX, y si es seguro, tal vez, su proveedor de atención médica le pida que tome XIAFLEX junto con otros medicamentos que ayudarán a prevenir problemas de coagulación. Su proveedor de atención médica puede decidir que XIAFLEX no es seguro para usted si tiene problemas de coagulación. Si se le indica que deje de tomar un anticoagulante antes de la inyección de XIAFLEX, su proveedor de atención médica le dirá cuándo puede volver a tomar su medicamento. Solicite a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos, si es seguro.

¿Qué debe saber sobre XIAFLEX?

Este es un medicamento de prescripción que se inyecta en el pene para tratar la enfermedad de la Peyronie incluyen los siguientes:

- una placa palpable y una curva de más de 30 grados en el pelo de la cabeza
- inflamación en el sitio de la inyección o a la largo del pene
- dolor o sensibilidad en el sitio de la inyección, a la largo del pene y pierna del pene
- hematomas en el pene
- corrosión en el pene o escroto (perdidas)
- erección dolorosa
- problemas de erección (disfunción eréctil)
- cambios de color en el pene
- ampollas en el sitio de la inyección
- dolor durante la relación sexual
- un bulto en el sitio de la inyección (nódulo)

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Estos son algunos de los posibles efectos secundarios de XIAFLEX. Para obtener información sobre los posibles efectos secundarios de XIAFLEX, consulte la información de prescripción completa o llame al 1-800-FDA-088.

Haga clic para ver la Ficha técnica **completa, incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA** de Guía del medicamento.

XIAFLEX® endo

© 2023-2024 Endo. Endo, Endo Pharmaceuticals, Endo Ventures, Endo Advantage, Endo Cares, XIAFLEX, and the Endo logo are trademarks of Endo Ventures Bio Management Company LLC.

EP-XIAFLEX-Guide-2024 Last Updated: 1-800-462-9363 (EMS)